

Рассмотрено и одобрено  
Ветбиофармсоветом Минсельхозпрода  
Республики Беларусь,  
протокол № 87 от 18 ноября 2016 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению препарата Толтразор® 2,5%  
раствор для орального применения

**1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Толтразор® 2,5% (Toltrazuril® 2,5%).

1.2 Препарат представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета. В 1 мл препарата содержится 25 мг толтразурила.

1.3. Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100, 500, 1000 и 2500 мл.

1.4. Препарат хранят с предосторожностью по списку Б при комнатной температуре от плюс 15°C до плюс 25°C в сухом, защищенном от света месте.

1.5. Срок годности препарата - 3 года от даты изготовления при указанных условиях хранения.

**2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

2.1 ТОЛТРАЗОР® 2,5% раствор для орального применения содержит в своем составе в качестве активного вещества толтразурил. Толтразурил эффективен в отношении видов *Eimeria*, вызывающих эймериоз у кур и индеек.

2.2 Механизм действия препарата заключается в ингибировании клеточного деления шизонтов и микрогамонтов, за счет ингибирования ряда ферментов, участвующих в синтезе примидина и клеточном дыхании. После терапии у птиц сохраняется иммунитет против эймериоза за счет того, что препарат эффективен и против внутриклеточных стадий *Eimeria*.

**3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА**

3.1 Препарат применяют для лечения и профилактики эймериоза у кур и индеек.

3.2 Для лечения эймериоза (кокцидиоза) суточный объем ТОЛТРАЗОР® 2,5% применяют два дня подряд в фармакологической дозе 7 мг/кг массы тела, т.е. 28 мл препарата (эквивалент 700 мг толтразурила) на 100 кг массы тела.

Толтразор® 2,5% добавляют в питьевую воду. Приготовленный раствор остается стабильным в течение 24 часов. Препарат можно применять в первый и во второй день по любой из следующих двух схем:

1) Толтразор® 2,5% раствор для орального применения добавляют в питьевую воду в суточном объеме и выпаивают птице в течение 2 дней.

2) В первый и во второй день препарат добавляют в питьевую воду в объеме, потребляемом за 8 часов, и выпаивают птице. В оставшиеся часы птиц обеспечивают чистой питьевой водой. В случае необходимости курс лечения проводят повторно через 5 дней.

3.3 Побочные (нежелательные) эффекты при назначении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдаются.

3.4 Толтразор® 2,5% запрещен к применению на территории Республики Беларусь для птиц, яйца которых используются в пищу людям.

3.5 Время ожидания. Убой кур и индеек на мясо не разрешается в период проведения терапии и в течение 21 суток после последнего применения препарата. До указанного срока мясо вынужденно убитых животных следует использовать на корм пушным зверям.

